



RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT: LACTOEX Sachets

Conditionnement: 1 X 25 Sachets

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque sachet de 1 gramme contient :

Lactobacilles Sporogenes150 millions de spores

Excipients Q.S.

3. Forme pharmaceutique: Poudre

4. Données cliniques

4.1 Indication thérapeutique :

Diarrhée

Ce médicament est utilisé pour le traitement de la diarrhée causée par des infections, des antibiotiques, etc.

Dyspepsie

Ce médicament est utilisé pour traiter l'indigestion ou les malaises à l'estomac.

Troubles digestifs

Ce médicament est utilisé pour soulager les symptômes des troubles digestifs tels que le Syndrome du côlon irritable, maladie inflammatoire de l'intestin, ulcères d'estomac, constipation, etc.

4.2 Posologie et mode d'administration

Adultes : 2-4 sachets / jour

Enfants : 1-2 sachets / jour ou selon les directives d'un médecin.

Ne pas prendre d'antibiotiques pendant au moins 1 heure pour protéger les bactéries du produit.

4.3 Contre-indications

N'est pas applicable

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

- Évitez d'utiliser ce médicament si vous êtes allergique au LACTOEX sachets ou à un produit similaire.
Demandez l'avis de votre médecin avant de prendre tout autre médicament ou produit à base d'herbes médicinales pendant votre traitement avec LACTOEX Sachets
- Éviter la consommation d'alcool car elle peut modifier l'absorption de LACTOEX sachet.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez LACTOEX sachet en cas d'insuffisance hépatique.



4.5 Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Vous devriez consulter votre médecin au sujet de toutes les interactions possibles des médicaments que vous prenez.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Ce médicament est considéré comme sûr pour une utilisation chez la femme enceinte. Cependant, il est conseillé de consulter votre médecin avant de prendre ce médicament. Ce médicament est considéré comme sûr pour une femme qui allaite. Cependant, il est conseillé de consulter votre médecin avant de prendre ce médicament.

4.7 Effets sur la capacité à conduire et à utiliser des machines

Sans objet.

4.8 Effets indésirables

Voici les effets indésirables les plus courants de LACTOEX en poudre :

1. Gaz
2. Malaises de l'estomac
3. Eructation

Les effets secondaires suivants sont graves et vous pourriez avoir besoin de soins médicaux immédiats :

1. Ballonnements
2. Diarrhée
3. Crampes d'estomac
4. Infection du foie

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive et d'autres peuvent survenir. Veuillez consulter votre médecin pour en savoir plus sur les autres effets secondaires possibles.

4.9 Surdosage

Il est conseillé de consulter votre médecin

5. Propriétés pharmacologiques

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Groupe pharmacothérapeutique: Antidiarrhéique.

Mécanisme d'action :

Il aide au rétablissement de la flore intestinale normale afin d'améliorer la digestion. Ainsi, il induit la réduction puis l'arrêt de la diarrhée.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Aucune donnée disponible

6. Données pharmaceutiques

6.1 Liste des excipients

Lactose, PVP K30, alcool isopropylique, citron capril, sucralose



6.2 Incompatibilités

N'est pas applicable

6.3 Durée de vie

36 mois

6.4 Précautions particulières pour le stockage

Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 25 °C.
Protéger de la lumière et de l'humidité.

6.5 Précautions particulières pour l'élimination et les autres manipulations

Aucune exigence particulière.

7. Titulaire De L'autorisation De Mise Sur Le Marché:

NIYA HEALTHCARE PVT. LTD.

Satara-415002, Inde

export@nhpl.co

8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE:

E-2019-1177

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION:

09/10/2019

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 08.06.2023

11. DOSIMETRIE

N'est pas applicable

**12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES
CONDITIONS**

N'est pas applicable

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

N'est pas applicable